

## 都道府県別松くい虫被害量（被害材積）の推移（総数）

（単位：千m<sup>3</sup>）

区 分 \ 年 度	H28	H29	H30	R元	R2	対前年度比
北海道	—	—	—	—	—	—
青森県	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	222%
岩手県	32.5	29.9	30.3	28.1	22.9	81%
宮城県	16.0	17.5	15.0	10.7	11.2	104%
秋田県	17.9	11.5	10.0	9.4	7.6	81%
山形県	34.2	26.6	25.5	24.1	20.1	83%
福島県	30.7	30.4	32.6	30.8	30.6	99%
茨城県	4.3	5.4	5.6	3.3	2.9	87%
栃木県	9.3	7.4	7.1	6.6	6.2	95%
群馬県	7.7	6.3	5.4	4.4	3.0	67%
埼玉県	0.1	0.0	—	—	0.0	皆増
千葉県	1.5	1.4	0.6	0.4	1.1	251%
東京都	0.1	0.0	0.1	0.0	0.6	4758%
神奈川県	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	70%
新潟県	7.4	4.0	3.5	4.4	3.2	73%
富山県	0.9	0.5	0.3	0.4	0.7	162%
石川県	5.5	4.5	3.9	5.1	7.2	140%
福井県	3.6	2.4	2.3	1.8	1.4	77%
山梨県	6.5	5.3	5.1	4.0	4.2	106%
長野県	74.4	76.1	73.9	72.0	65.7	91%
岐阜県	0.7	0.4	0.3	0.6	0.5	75%
静岡県	6.4	6.7	8.5	6.8	7.2	106%
愛知県	1.2	0.9	0.8	0.9	0.8	93%
三重県	2.5	2.1	2.2	0.9	0.4	40%
滋賀県	1.2	0.9	0.7	0.5	0.4	76%
京都府	9.6	14.0	8.6	5.1	3.0	59%
大阪府	0.9	0.8	0.5	0.5	0.5	100%
兵庫県	3.8	2.8	2.8	1.6	2.0	125%
奈良県	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	112%
和歌山県	0.4	0.4	0.5	0.8	1.4	170%
鳥取県	4.6	6.8	3.0	3.3	3.9	118%
島根県	11.2	9.8	8.1	2.9	2.9	100%
岡山県	3.8	3.4	3.0	4.2	4.1	98%
広島県	14.9	12.5	11.2	9.4	9.6	102%
山口県	20.0	18.8	17.6	14.1	14.0	99%
徳島県	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	145%
香川県	12.5	6.2	5.7	5.8	5.3	92%
愛媛県	4.5	3.9	3.5	3.0	3.0	100%
高知県	0.1	0.1	0.3	0.2	0.1	53%
福岡県	7.2	5.5	5.5	2.0	3.8	194%
佐賀県	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	111%
長崎県	1.7	5.9	14.0	11.3	26.5	234%
熊本県	0.2	0.3	0.5	0.4	0.5	118%
大分県	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	122%
宮崎県	3.1	1.7	1.0	1.1	1.3	118%
鹿児島県	70.2	62.0	29.9	18.7	16.0	86%
沖縄県	4.5	2.3	1.2	0.7	0.7	93%
合 計	440.1	399.3	352.2	302.1	298.1	99%

注1 民有林（林野庁所管以外の国有林含む。）については、都道府県からの報告による。

2 国有林（官行造林地を含む。）については、森林管理局からの報告による。

3 都道府県ごとに小数点以下第二位を四捨五入した。

4 四捨五入により合計と一致しない場合がある。

5 被害の発生していないものを「—」、50m<sup>3</sup>未満の被害が発生しているものを「0.0」としている。